

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
основная общеобразовательная школа № 8 имени полного кавалера
ордена Славы Александра Галустовича Алафердова
поселка Садового муниципального образования Славянский район**

Методическое пособие

«Химия. Подготовка к ОГЭ. Часть 2»

**Олейникова Виолета Викторовна,
учитель биологии и химии МБОУ ООШ № 8**

Славянский район Краснодарский край

2023

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	3
Задание 20. Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель.....	4
Задание 21. Взаимосвязь различных классов неорганических веществ. Реакции ионного обмена и условия их осуществления.....	7
Задание 22. Вычисление количества вещества, массы или объёма вещества по количеству вещества, массе или объёму одного из реагентов или продуктов реакции. Вычисление массовой доли растворённого вещества в растворе.....	11
Задание 23. Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы IV–VII групп и их соединений»; «Металлы и их соединения». Качественные реакции на ионы в растворе (хлорид-, иодид-, сульфат-, карбонат-, силикат-, фосфат-, гидроксид-ионы; ион аммония; катионы изученных металлов, а также бария, серебра, кальция, меди и железа).....	14
Ответы к самостоятельным работам.....	23
Список литературы.....	25

Введение

Вторая часть экзамена состоит из 5 заданий. К заданиям 20–23 следует дать полный развёрнутый ответ, включающий в себя необходимые уравнения реакций и расчёты.

Задание 24 предполагает выполнение эксперимента под наблюдением экспертов. К этому заданию следует приступать после выполнения задания 23 и не ранее, чем через 30 минут после начала экзамена.

Данное пособие предлагается учителям и ученикам для подготовки к экзамену по химии второй части.

Пособие содержит теорию и примеры разбора материала, также задания для самостоятельной работы учащихся по следующим темам:

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель.

Взаимосвязь различных классов неорганических веществ. Реакции ионного обмена и условия их осуществления.

Вычисление количества вещества, массы или объёма вещества по количеству вещества, массе или объёму одного из реагентов или продуктов реакции. Вычисление массовой доли растворённого вещества в растворе.

Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы IV–VII групп и их соединений»; «Металлы и их соединения». Качественные реакции на ионы в растворе (хлорид-, иодид-, сульфат-, карбонат-, силикат-, фосфат-, гидроксид-ионы; ион аммония; катионы изученных металлов, а также бария, серебра, кальция, меди и железа)

Так же материал может использоваться учителями на разных этапах урока: при изучении нового материала, повторении и закреплении изученного, а также при проверке и обобщении знаний.

Данный материал рекомендован к использованию в образовательных учреждениях.

Задание 20. Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель.

Для выполнения этого задания необходимо рассмотреть следующий материал.

Окислительно-восстановительные реакции (ОВР) — реакции, протекающие с изменением степеней окисления атомов всех или некоторых элементов, входящих в состав реагирующих веществ.

Окислением называют процесс отдачи электронов (атомов, ионов или молекул), в результате которого степень окисления повышается.

Восстановлением называют процесс присоединения электронов (атомов, ионов или молекул), в результате которого степень окисления понижается.

Окислителем называют частицы (атомы, ионы или молекулы) которые присоединяют электроны.

Восстановителем называют частицы (атомы, ионы или молекулы) которые отдаёт электроны.

Степень окисления — это условный заряд атома в соединении, рассчитанный исходя из условия, что все связи в соединении ионные.

Основные правила вычисления степени окисления элементов:

- 1) Степень окисления свободных атомов и простых веществ равна 0: (Zn^0 ; Mg^0).
- 2) Степень окисления водорода в соединениях с неметаллами равна +1, а с металлами равна -1: (NaH^{-1} , $H^{+1}Cl$).
- 3) Степень окисления фтора в соединениях всегда равна -1: (HF^{-1} , CaF_{12}^{-1}).
- 4) Степень окисления кислорода в соединениях равна -2 (NO^{-2} , $Al_2O^{-2}_3$), а в пероксидах -1 ($H_2O^{-1}_2$, $O^{+1}F_2$).
- 5) Степень окисления металлов в соединениях всегда положительная, у металлов I-A, II-A, III-A соответственно равна +1, +2, +3.
- 6) Суммарная степень окисления всех атомов в молекуле равна 0.
- 7) Высшая степень окисления элемента равна (+№ группы).
- 8) Низшая степень окисления: для металлов равна 0, для неметаллов равна (№ группы -8).

Для составления ОВР используют **метод электронного баланса**.


Метод электронного баланса — метод расстановки коэффициентов в ОВР, основанный на том, что количество электронов, отданных восстановителем, равно числу электронов, полученных окислителем.

Рассмотрим алгоритм составления уравнений методом электронного баланса на примере.

- 1) Записываем схему реакции:



- 2) Определяем степени окисления у атомов элементов, изменяющих ее величину:



3) Составляем схему электронного баланса. Для этого записываем химические знаки элементов, атомы которых изменяют степень окисления, и определяем, сколько электронов отдают или присоединяют соответствующие атомы или ионы.

Указываем процессы окисления и восстановления, окислитель и восстановитель.

Уравниваем количество отданных и принятых электронов и, таким образом, определяем коэффициенты при восстановителе и окислителе (в данном случае они соответственно равны 5 и 2):



4) Далее остальные элементы уравниваем остальные элементы и заменяем стрелку в схеме на знак равенства в уравнении реакции:



Важно знать:

1) Правила подбора коэффициентов, сначала надо уравнять число атомов металлов, затем – кислотных остатков (атомов неметаллов), затем атомов водорода, и последним – атомов кислорода.


2) Состав продуктов восстановления перманганат-иона MnO_4^- зависит от реакции среды. Перманганат калия в разных средах восстанавливается до разных продуктов:

в условиях кислой среды ($pH < 7$) - до солей Mn^{2+} ;

в условиях нейтральной среды ($pH \sim 7$) - до MnO_2 ;

в условиях сильнощелочной среды ($pH > > 7$) - до манганата MnO_4^{2-} . [17]

3) Если в формуле окислителя (восстановителя) или продукта его восстановления (окисления) указано два атома, изменяющие степень окисления (H_2 , O_2 , Cl_2 , N_2O , $K_2Cr_2O_7$ и т.д.), то в электронном уравнении это надо учитывать:



При этом цифру «2» ставят:

в виде индекса только в формулах простых веществ, молекулы которых двухатомны: H_2 , O_2 , N_2 , Cl_2 и т.д.;

в виде коэффициента в остальных случаях: $2O^{-2}$, $2Fe^{3+}$, $2Cr^{+5}$ и т.д. [1]

Рассмотрим несколько примеров к заданию 20.

Пример № 1.

Используя метод электронного баланса, расставьте коэффициенты в уравнении реакции, схема которой: $MnO_2 + HBr \rightarrow MnBr_2 + Br_2 + H_2O$. Определите окислитель и восстановитель.

Элементы ответа:

1) Составлен электронный баланс:



2) Расставлены коэффициенты в уравнении реакции:



Оценивание: ответ правильный и полный, содержит все названные выше элементы, 3 балла.

Пример № 2.

Используя метод электронного баланса, расставьте коэффициенты в уравнении реакции, схема которой: $\text{HNO}_3 + \text{I}_2 \rightarrow \text{HIO}_3 + \text{NO} + \text{H}_2\text{O}$

Определите окислитель и восстановитель.

Элементы ответа:

1) Составлен электронный баланс:



2) Расставлены коэффициенты в уравнении реакции:



Оценивание: ответ правильный и полный, содержит все названные выше элементы, 3 балла.

Пример № 3.

Используя метод электронного баланса, расставьте коэффициенты в уравнении реакции, схема которой:



Определите окислитель и восстановитель.

Элементы ответа:

1) Составлен электронный баланс:



2) Расставлены коэффициенты в уравнении реакции:




Оценивание: ответ правильный и полный, содержит все названные выше элементы, 3 балла.

Пример № 4.


Используя метод электронного баланса, расставьте коэффициенты в уравнении реакции, схема которой: $\text{Ca} + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{CaSO}_4 + \text{H}_2\text{S} + \text{H}_2\text{O}$
Определите окислитель и восстановитель.

Элементы ответа:

3) Составлен электронный баланс:



4) Расставлены коэффициенты в уравнении реакции:






Оценивание: ответ правильный и полный, содержит все названные выше элементы, 3 балла.

Для закрепления материала выполните следующие задания.

Самостоятельная работа

Используя теоретический материал и примеры разбора, попробуйте расставить коэффициенты в уравнениях химических реакций, методом электронного баланса.




Задание 21. Взаимосвязь различных классов неорганических веществ. Реакции ионного обмена и условия их осуществления.

Для выполнения этого задания необходимо рассмотреть следующий материал.

Связь между классами неорганических соединений, которая основана на получении веществ одного класса из веществ другого класса, **называется генетической**.

Переходы от веществ одних классов к веществам других классов условно изображены стрелками:




Из этой схемы видно, что простые вещества, оксиды, гидроксиды и соли последовательно получают друг друга, образуют ряд взаимосвязанных между собой веществ.

Известны следующие виды рядов:


1) Ряд металлов и их соединений.

Металл → основный оксид → основание → соль.


Для получения оксида магния из чистого металла, осуществим реакцию взаимодействия с кислородом.



При взаимодействии основного оксида с водой, в частности оксида магния, получим основание – гидроксид магния.




Для получения соли из нерастворимого основания, необходимо добавить кислоту.



2) Ряд неметаллов и их соединений.

Неметалл → кислотный оксид → кислота → соль.


Для получения оксида углерода осуществим реакцию взаимодействия с кислородом – горение. Протекает с выделением энергии.



При взаимодействии кислотного оксида с водой, в частности оксида углерода, получим угольную кислоту.



Для получения соли из кислоты, необходимо добавить основание.



Для составления генетических цепочек необходимо знать химические свойства каждого класса неорганических соединений, а также валентные возможности того элемента, который лежит в основе генетического ряда. [7]


Реакции, протекающие между ионами, **называют ионными реакциями.**

Правила составления уравнений реакций ионного обмена.


1. Записываем молекулярное уравнение реакции, не забывая расставить коэффициенты:



2. С помощью таблицы растворимости определяем растворимость каждого вещества. Подчеркиваем вещества, которые мы будем представлять в виде ионов.




3. Составляем полное ионное уравнение. Сильные электролиты записываем в виде ионов, а слабые электролиты, малорастворимые вещества и газообразные вещества записываем в виде молекул.




Важно помнить: Заряд иона записывается: SO_4^{2-} , K^+ . Степень окисления химического элемента: C^{+4} , O^{-2} .

4. Находим одинаковые ионы (они не приняли участия в реакции в левой и правой частях уравнения реакции) и сокращаем их слева и справа.



5. Составляем сокращенное ионное уравнение (выписываем формулы ионов или веществ, которые приняли участие в реакции).



Важно помнить: При наличии коэффициентов в сокращенном ионном уравнении их необходимо сократить.



Записываем сокращенное ионное уравнение.



К условиям возникновения и протекания химической реакции относится: приведение реагирующих веществ в соприкосновение; нагревание до определённой температуры; освещение.

Признаками химических реакций являются: образование или растворение осадка, выделение или поглощение газа, изменение цвета, выделение или поглощение теплоты. [2]

Рассмотрим несколько примеров к заданию 21.



Пример № 1.

Дана цепочка превращений: $\text{P}_2\text{O}_5 \rightarrow \text{H}_3\text{PO}_4 \rightarrow \text{Na}_3\text{PO}_4 \rightarrow \text{Ag}_3\text{PO}_4$.

Напишите молекулярные уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить указанные превращения. Для третьего превращения составьте сокращённое ионное уравнение.

Элементы ответа:

Написаны уравнения реакций, соответствующие схеме превращений:



Составлено сокращённое ионное уравнение третьего превращения:



Оценивание: ответ правильный и полный, содержит все названные элементы, составляет 4 балла.




Пример № 2.

Дана схема превращений: $\text{Fe}(\text{NO}_3)_2 \rightarrow \text{Fe}(\text{OH})_2 \rightarrow \text{X} \rightarrow \text{Fe}_2\text{O}_3$

Напишите молекулярные уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить указанные превращения. Для первого превращения составьте сокращённое ионное уравнение реакции.

Элементы ответа:

Написаны уравнения реакций, соответствующие схеме превращений:



Составлено сокращённое ионное уравнение первого превращения:



Оценивание: ответ правильный и полный, содержит все названные элементы, 4 балла.




Пример № 3.

Дана цепочка превращений: $\text{Na}_2\text{CO}_3 + \xrightarrow{\text{HCl}} \text{X}_1 \rightarrow \text{CaCO}_3 \rightarrow \text{X}_2$.


Напишите молекулярные уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить указанные превращения. Для первого превращения составьте сокращённое ионное уравнение.

Элементы ответа:

Написаны уравнения реакций, соответствующие схеме превращений:



Составлено сокращённое ионное уравнение первого превращения:



Оценивание: ответ правильный и полный, содержит все названные элементы, 4 балла.



Пример № 4.

Дана схема превращений: $\text{Na} \xrightarrow{+\text{H}_2\text{O}} \text{X} \rightarrow \text{Na}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{BaSO}_4$

Напишите молекулярные уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить указанные превращения. Для последнего превращения составьте сокращённое ионное уравнение реакции.

Элементы ответа:

Написаны уравнения реакций, соответствующие схеме превращений:



Составлено сокращённое ионное уравнение последнего превращения:





Оценивание: ответ правильный и полный, содержит все названные элементы, 4 балла. [10]

Для закрепления материала выполните следующие задания.

Самостоятельная работа

Напишите молекулярные уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить указанные превращения. Для реакций ионного обмена составьте сокращённые ионные уравнения реакций.

+NaOH



Задание 22. Вычисление количества вещества, массы или объёма вещества по количеству вещества, массе или объёму одного из реагентов или продуктов реакции. Вычисление массовой доли растворённого вещества в растворе.

Для решения этого задания необходимо рассмотреть следующий материал.

Моль – это количество вещества, содержащее столько же частиц (атомов, молекул и др.), сколько содержится атомов углерода в 0,012 кг углерода, масса которого равна 12 а.е.м.

Количество вещества v (ню), выражается в моль.

$$v = m / M$$

где M – молярная масса вещества, v – количество вещества, m – масса вещества.

Молярная масса – величина постоянная. Численное значение молярной массы соответствует значению относительной атомной или относительной молекулярной массы.

Массовая доля ω (омега) – это отношение массы растворенного вещества к массе раствора.

$$\omega = \frac{m(v-ea)}{m(p-pa)} \cdot 100\%$$

Она выражается в долях единицы или в процентах.

Масса раствора складывается из массы растворенного вещества и растворителя, как правило воды: $m(p-pa) = m(v-ea) + m(H_2O)$


Рассмотрим несколько примеров к заданию 22.

Пример № 1.

После пропускания через раствор гидроксида натрия 2,24 л сернистого газа (н.у.) получили 252 г раствора Na_2SO_3 . Вычислите массовую долю соли в полученном растворе.

Элементы ответа:

1) Составлено уравнение реакции:



2) Рассчитано количество вещества сернистого газа:

$$v(SO_2) = V(SO_2) / V_m = 2,24 : 22,4 = 0,1 \text{ моль}$$

3) По уравнению реакции рассчитано количество сульфита натрия

$$v(Na_2SO_3) = v(SO_2) = 0,1 \text{ моль}$$

3) Определена масса сульфита натрия в растворе:

$$m(Na_2SO_3) = v(Na_2SO_3) \cdot M(Na_2SO_3) = 0,1 \cdot 126 = 12,6 \text{ г}$$

4) Определена массовая доля сульфита натрия в растворе:

$$\omega(Na_2SO_3) = m(Na_2SO_3) \cdot 100\% : m(p-pa) = 12,6 \cdot 100\% : 252 = 5\%$$


Оценивание: Ответ правильный и полный, содержит все названные элементы, 3 балла.

Пример № 2.

170 г раствора нитрата серебра смешали с избытком раствора хлорида натрия. Выпал осадок массой 8,61 г. Вычислите массовую долю соли в растворе нитрата серебра.

Элементы ответа:

1) Составлено уравнение реакции:



2) Рассчитано количество вещества хлорида серебра:

$$v(\text{AgCl}) = m(\text{AgCl}) : M(\text{AgCl}) = 8,61 : 143,5 = 0,06 \text{ моль}$$

3) Рассчитано количество вещества нитрата серебра по уравнению реакции:

$$v(\text{AgNO}_3) = v(\text{AgCl}) = 0,06 \text{ моль}$$

4) Рассчитана масса нитрата серебра, содержащегося в исходном растворе:

$$m(\text{AgNO}_3) = v(\text{AgNO}_3) \cdot M(\text{AgNO}_3) = 0,06 \cdot 170 = 10,2 \text{ г}$$

5) Определена массовая доля нитрата серебра в растворе:

$$\omega(\text{AgNO}_3) = m(\text{AgNO}_3) : m_{\text{р-па}}(\text{AgNO}_3) = 10,2 : 170 = 6\%$$


Оценивание: Ответ правильный и полный, содержит все названные элементы, 3 балла.

Пример № 3.

При взаимодействии избытка раствора карбоната калия с 10%-ным раствором нитрата бария выпало 3,94 г осадка. Определите массу взятого для опыта раствора нитрата бария.

Элементы ответа:

1) Составлено уравнение реакции:



2) Рассчитано количество вещества карбоната бария:

$$v(\text{BaCO}_3) = m(\text{BaCO}_3) : M(\text{BaCO}_3) = 3,94 \text{ г} : 197 \text{ г/моль} = 0,02 \text{ моль}$$

3) Рассчитано количество вещества нитрата бария по уравнению реакции:

$$v(\text{Ba}(\text{NO}_3)_2) = v(\text{BaCO}_3) = 0,02 \text{ моль}$$

4) Рассчитана масса растворённого вещества нитрата бария:

$$m(\text{Ba}(\text{NO}_3)_2) = v(\text{Ba}(\text{NO}_3)_2) \cdot M(\text{Ba}(\text{NO}_3)_2) = 0,02 \text{ моль} \cdot 261 \text{ г/моль} = 5,22 \text{ г}$$

4) Рассчитана масса раствора нитрата бария:

$$m_{\text{р-па}}(\text{Ba}(\text{NO}_3)_2) = m(\text{Ba}(\text{NO}_3)_2) : \omega \cdot 100\% = 5,22 \text{ г} : 10\% \cdot 100\% = 52,2 \text{ г}$$


Оценивание: Ответ правильный и полный, содержит все названные элементы, 3 балла.

Пример № 4.

При добавлении к раствору серной кислоты с массовой долей 10% избытка раствора хлорида бария образовался осадок массой 34,95 г. Определите массу исходного раствора серной кислоты.

Элементы ответа:

1) Составлено уравнение реакции:



2) Определено количество вещества серной кислоты:

$$v(\text{BaSO}_4) = m(\text{BaSO}_4) : M(\text{BaSO}_4) = 34,95 : 233 = 0,15 \text{ моль}$$

3) Рассчитано количество вещества серной кислоты по уравнению реакции:

$$v(\text{H}_2\text{SO}_4) = v(\text{BaSO}_4) = 0,15 \text{ моль}$$

4) Рассчитано масса растворённого вещества серной кислоты:

$$m(\text{H}_2\text{SO}_4) = v(\text{H}_2\text{SO}_4) \cdot M(\text{H}_2\text{SO}_4) = 0,15 \cdot 98 = 14,7 \text{ г}$$

3) Определена масса раствора серной кислоты:

$$m_{\text{р-ра}}(\text{H}_2\text{SO}_4) = m(\text{H}_2\text{SO}_4) : \omega \cdot 100\% = 14,7 : 10\% \cdot 100\% = 147 \text{ г.}$$

Оценивание: Ответ правильный и полный, содержит все названные элементы, 3 балла.

Для закрепления материала выполните следующие задания.

Самостоятельная работа

Вычислите массовую долю растворённого вещества в растворе.

А) При растворении 10 г технического цинка в избытке разбавленной соляной кислоты выделилось 3,1 л (н.у.) водорода. Определите массовую долю примесей в этом образце цинка.

Б) При взаимодействии 30,93 г руды, содержащей карбонат железа(II), с избытком соляной кислоты выделилось 4,48 л углекислого газа. Определите массовую долю примесей в руде.

Вычислите объём вещества по массе одного из реагентов реакции.

В) Определите объём (н.у.) углекислого газа, выделяющегося при растворении 110 г известняка, содержащего 92% карбоната кальция, в избытке азотной кислоты.

Вычислите массу по объёму одного из продуктов реакции.

Г) При растворении в разбавленной серной кислоты образца цинка, содержащего 4,5% нерастворимых примесей, выделилось 2,24 л (н.у.) водорода. Определите массу образца металла. [16]

**Задание 23. Решение экспериментальных задач по теме
«Неметаллы IV–VII групп и их соединений»; «Металлы и их
соединения». Качественные реакции на ионы в растворе (хлорид-,
иодид-, сульфат-, карбонат-, силикат-, фосфат-, гидроксид-ионы; ион
аммония; катионы изученных металлов, а также бария, серебра,
кальция, меди и железа)**


Для выполнения этого задания необходимо изучить следующий материал. Рассмотрим химические свойства основных классов неорганических соединений.

Химические свойства основных оксидов

1. Взаимодействие с водой.

С водой способны реагировать оксиды тех металлов, которым соответствуют растворимые гидроксиды, т.е. реагируют только оксиды щелочных и щелочноземельных металлов.

Схема: основный оксид + вода = основание



Оксид магния взаимодействует с водой только при нагревании.

2. Взаимодействие с кислотными оксидами и кислотами.

Основные оксиды, соответствующие щелочам, взаимодействуют со всеми кислотными оксидами и кислотами.

Схема: основный оксид + кислотный оксид = соль




Схема: основный оксид + кислота = соль + вода



3. Взаимодействие с амфотерными оксидами.

В эту реакцию могут вступать только основные оксиды щелочных или щелочноземельных металлов. При сплавлении двух оксидов образуется соль.

Схема: основный оксид + амфотерный оксид = соль




Химические свойства кислотных оксидов

1. Взаимодействие с водой.

Кислотные оксиды взаимодействуют с водой с образованием соответствующих кислот. За исключением SiO_2 , которому соответствует нерастворимая кремниевая кислота.

Схема: кислотный оксид + вода = кислота



2. Взаимодействия с основными оксидами и щелочами.

Кислотные оксиды сильных кислот способны взаимодействовать с любыми основными оксидами или основаниями.

Схема: кислотный оксид + основный оксид = соль




Схема: кислотный оксид + основание = соль + вода



Химические свойства амфотерных оксидов

1. Взаимодействие с водой.

Амфотерные оксиды не взаимодействуют с водой — даже при нагревании!

Схема: амфотерный оксид + вода ≠

2. Взаимодействие с кислотными оксидами и кислотой.

Амфотерные оксиды взаимодействуют только с сильными и средними кислотами и их оксидами.

Схема: амфотерный оксид + кислотный оксид = соль, где амфотерный оксид играет роль основного оксида



Схема: амфотерный оксид + кислота = соль + вода



3. Взаимодействие с основными оксидами.

Амфотерные оксиды взаимодействуют только с теми оксидами, которые соответствуют щелочам. Реакция протекает только в расплаве, так как в растворе такие оксиды взаимодействуют преимущественно с водой с образованием щелочей.

Схема: амфотерный оксид + основный оксид (расплав) = соль, где амфотерный оксид играет роль кислотного оксида



4. Взаимодействие со щелочами.

Продукты взаимодействия амфотерных оксидов со щелочами зависят от условий проведения реакции. В растворе образуются комплексные соли, а при сплавлении — средние соли.

Схема: амфотерный оксид + щелочь (р-р) + вода = комплексная соль, где амфотерный оксид играет роль кислотного оксида



Схема: амфотерный оксид + щелочь (расплав) = средняя соль + вода, где амфотерный оксид играет роль кислотного оксида



Химические свойства оснований

1. Взаимодействие с кислотами.

Щелочи вступают в реакцию со всеми кислотами, реакция нейтрализации. Нерастворимые основания могут взаимодействовать только с сильными кислотами.

Схема: основание + кислота = соль + вода



2. Взаимодействие с кислотными оксидами.

Щелочи вступают в реакцию с любыми кислотными оксидами. Нерастворимые основания взаимодействуют только с кислотными оксидами, которые соответствуют сильным кислотам.

Схема: кислотный оксид + основание = соль + вода



3. Взаимодействие с солями.

В результате такой реакции должен выделяться осадок или газ.

Схема: основание 1+ соль 1= основание 2+ соль 2, (\downarrow , \uparrow)



4. Термическое разложение.

При нагревании нерастворимые основания разлагаются на соответствующий оксид (степень окисления металла остается неизменной) и воду.

t°

Схема: нерастворимое основание = основной оксид + вода t°




5. Взаимодействие с амфотерными оксидами. Продукты реакции зависят от условий ее проведения.

Схема: амфотерный оксид + щелочь (расплав) = соль + вода



Схема: амфотерный оксид + щелочь (р-р) = комплексная соль



6. Взаимодействие с амфотерными гидроксидами. Продукты реакции зависят от условий ее проведения.


При сплавлении двух оснований:

Схема: амфотерный гидроксид (тв) + щелочь (тв) = средняя соль + вода



Если реакция проводится в растворе:

Схема: амфотерный гидроксид (р-р) + щелочь (р-р) = комплексная соль



7. Способность щелочей окрашивать индикаторы.

Индикаторы:

лакмус из фиолетового становится синим;

метилоранж из оранжевого становится желтым;

фенолфталеин из бесцветного становится малиновым.

Химические свойства кислот

1) Взаимодействие с основаниями.

Взаимодействие кислот с основаниями называют реакцией нейтрализации.

Схема: основание + кислота = соль + вода



2) Взаимодействие с основными и амфотерными оксидами.

Кислоты вступают в реакцию с основными и амфотерными оксидами (последние ведут себя как основные оксиды).

Схема: основной оксид + кислота = соль + вода





Схема: амфотерный оксид + кислота = соль + вода Пример:



3) Взаимодействие с солями.

Сильные кислоты вытесняют слабые из растворов их солей, образуются новая соль и новая кислота. Одним из продуктов реакции должны быть нерастворимая соль или слабая кислота, вода или газ.

Схема: кислота 1+ соль 1= соль 2+ кислота 2, (\downarrow , \uparrow)



4) Разлагаются при нагревании.

Для разложения некоторых кислот необходимо нагревание или излучение (HCl , HNO_3 , H_3PO_4) другие же разлагаются самопроизвольно в момент образования (H_2CO_3 , H_2SO_3 , HNO_2).

Кислородсодержащие кислоты при разложении образуют кислотный оксид и воду.

Схема: кислота = кислотный оксид + вода

t°



Бескислородные кислоты при разложении образуют простые вещества.

Схема: кислота = неметалл + металл



5) Взаимодействие с металлами.

Схема: металл + кислота = соль + водород



6) Способность кислот окрашивать индикаторы.

Способность изменять окраску индикаторов является общим свойством кислот.

Индикаторы:

лакмус (в нейтральной среде – фиолетовый), в кислой – красный;

метилоранж (в нейтральной среде – оранжевый), в кислой – красный;

фенолфталеин (в нейтральной среде – бесцветный), в кислой – бесцветный.

Химические свойства солей

1) Растворимые соли являются электролитами, следовательно, могут распадаться на ионы. Средние соли диссоциируют сразу:



2) Термическое разложение:

Схема: соль = основной оксид + кислотный оксид

t°



3) Взаимодействие с металлами. Более активные металлы вытесняют менее активные металлы из растворов солей. Для этого используем электрохимический ряд активности металлов (ряд напряжений).

Схема: соль 1+ металл 1= соль 2 + металл 2

Пример: $\text{CuSO}_4 + \text{Fe} = \text{FeSO}_4 + \text{Cu}$

4) Взаимодействие с кислотами.

Одним из продуктов реакции должны быть нерастворимая соль или слабая кислота, вода или газ.

Схема: соль 1 + кислота 1 = соль 2 + кислота 2, (\downarrow , \uparrow)

Пример: $\text{K}_2\text{CO}_3 + 2\text{HCl} = 2\text{KCl} + \text{CO}_2\uparrow + \text{H}_2\text{O}$

5) Взаимодействие с щелочью.

Одним из продуктов реакции должны быть нерастворимая соль или нерастворимое основание.

Схема: соль 1 + щелочь = соль 2 + основание, (\downarrow , \uparrow)

Пример: $\text{Fe}(\text{NO}_3)_3 + 3\text{NaOH} = \text{Fe}(\text{OH})_3 + 3\text{NaNO}_3$

6) Взаимодействие с солями.

Одним из продуктов реакции должны быть нерастворимая соль.

Формула: соль 1 + соль 2 = соль 3 + соль 4, (\downarrow , \uparrow)

Пример: $\text{CuSO}_4 + \text{BaCl}_2 = \text{BaSO}_4\downarrow + \text{CuCl}_2$ [16]

Таблица 1.

Качественные реакции на катионы (положительно заряженный ион).

Катион	Реагент или воздействие	Признаки реакции	Уравнения реакции
H^+	Индикаторы	лакмус - покраснеют, метиловый оранжевый—порозовеет	Не записываем
Na^+	Пламя	Окраска пламени становится равномерно желтой.	Не записываем
K^+	Пламя	Окраска пламени становится равномерно фиолетовой.	Не записываем
Ag^+	Раствор с анионом Cl^-	Выпадает белый творожистый осадок, не растворимый в азотной кислоте, чернеющий на свету.	$\text{Ag}^+ + \text{Cl}^- = \text{AgCl}\downarrow$
NH_4^+	Раствор щелочи при нагревании	Запах аммиака. Влажная индикаторная бумага дает изменение как на ион OH^-	$\text{NH}_4^+ + \text{OH}^- = \text{NH}_3\uparrow + \text{H}_2\text{O}$
Cu^{2+}	Раствор щелочи	Осадок синего цвета	$\text{Cu}^{2+} + 2\text{OH}^- = \text{Cu}(\text{OH})_2\downarrow$
Ba^{2+}	1) пламя; 2) раствор анионом SO_4^{2-}	1) Окраска пламени становится равномерно желто-зеленой; 2) выпадает белый осадок, который в кислотах не растворяется.	1) Не записываем; 2) $\text{Ba}^{2+} + \text{SO}_4^{2-} = \text{BaSO}_4\downarrow$

Fe^{2+}	Красная кровяная соль $\text{K}_3(\text{Fe}(\text{CN})_6)$	Выпадает темно-синий осадок.	$\text{K}^++\text{Fe}^{2+}+(\text{Fe}(\text{CN})_6)^{3-}\Rightarrow \text{KFe}(\text{Fe}(\text{CN})_6)\downarrow$
Ca^{2+}	Пламя	Окраска пламени становится равномерно кирпично-красной.	Не записываем
Fe^{3+}	1) Желтая кровяная соль $\text{K}_4(\text{Fe}(\text{CN})_6)$; 2) роданид-ион SCN^- 3) раствор щелочи	1) Выпадает синий осадок; 2) кроваво-красное окрашивание раствора; 3) выпадает бурый осадок.	1) $\text{K}^++\text{Fe}^{3+}+(\text{Fe}(\text{CN})_6)^{4-}\Rightarrow \text{KFe}(\text{Fe}(\text{CN})_6)\downarrow$ 2)не записываем 3) $\text{Fe}^{3+}+3\text{OH}^- = \text{Fe}(\text{OH})_3\downarrow$

Таблица 2.

Качественные реакции на анионы (отрицательно заряженный ион)

<i>Анион</i>	<i>Реагент</i>	<i>Признаки реакции</i>		<i>Уравнения реакции</i>
OH^-	Индикаторы	универсальный индикатор и лакмус - посинеют, метиловый оранжевый—пожелтеет.		Не записываем
Cl^-	Раствор катионом Ag^+	c	Выпадает белый творожистый осадок, не растворимый в азотной кислоте, чернеющий на свету.	$\text{Cl}^-+\text{Ag}^+=\text{AgCl}\downarrow$
Br^-	Раствор катионом Ag^+	c	Выпадение светло-желтого осадка, который растворяется в азотной кислоте и темнеет на свету.	$\text{Br}^-+\text{Ag}^+=\text{AgBr}\downarrow$
J^-	Раствор катионом Ag^+	c	Выпадение желтого осадка, который растворяется в азотной кислоте и темнеет на свету.	$\text{J}^-+\text{Ag}^+=\text{AgJ}\downarrow$
S^{2-}	Раствор катионом Pb^{2+}	c	Выпадает черный осадок.	$\text{S}^{2-}+\text{Pb}^{2+}=\text{PbS}\downarrow$
SO_4^{2-}	Раствор катионом Ba^{2+}	c	Выпадает белый осадок, который в кислотах не растворяется.	$\text{SO}_4^{2-}+\text{Ba}^{2+}=\text{BaSO}_4\downarrow$
SO_3^{2-}	Раствор катионом H^+	c	Выделяется газ, имеющий запах жженой спички.	$\text{SO}_3^{2-}+2\text{H}^+=\text{H}_2\text{O}+\text{SO}_2\uparrow$
CO_3^{2-}	Раствор катионом Ca^{2+}	c	Выпадает белый осадок, который в кислотах растворяется с выделением газа без цвета и запаха.	$\text{CO}_3^{2-}+\text{Ca}^{2+}=\text{CaCO}_3\downarrow$

PO_4^{3-}	Раствор кationом Ag^+	с	Выпадает желтый осадок, который растворяется в азотной кислоте.	$\text{PO}_4^{3-} + 3\text{Ag}^+ = \text{Ag}_3\text{PO}_4 \downarrow$
[14]				

Рассмотрим несколько примеров к заданию 23.

Пример № 1.

Дан раствор сульфата магния, а также набор следующих реагентов: цинк; соляная кислота; растворы гидроксида натрия, хлорида бария и нитрата калия.

Используя только реагенты из перечня, запишите молекулярные уравнения двух реакций, которые характеризуют химические свойства сульфата магния, и укажите признаки их протекания (наличие/отсутствие запаха у газа, цвет осадка или раствора).

Элементы ответа:

Составлены уравнения двух реакций и указаны признаки их протекания:

- 1) $\text{MgSO}_4 + \text{BaCl}_2 = \text{BaSO}_4 \downarrow + \text{MgCl}_2$
- 2) выпадение белого осадка;
- 3) $\text{MgSO}_4 + 2\text{NaOH} = \text{Mg(OH)}_2 \downarrow + \text{Na}_2\text{SO}_4$
- 4) выпадение белого осадка

Оценивание: Ответ правильный и полный, содержит все названные элементы, 4 балла.

Пример № 2.

Даны вещества: Zn, H_2SO_4 (разб.), Fe, Cu, NaOH, CuSO_4 . Используя воду и необходимые вещества только из этого списка, получите в две стадии гидроксид цинка(II). Опишите признаки проводимых реакций. Для реакции ионного обмена напишите сокращённое ионное уравнение реакции.

Элементы ответа:

Составлены два уравнения реакции:

- 1) $\text{Zn} + \text{H}_2\text{SO}_4 = \text{ZnSO}_4 + \text{H}_2 \uparrow$
- 2) $\text{ZnSO}_4 + 2\text{NaOH} = \text{Zn(OH)}_2 \downarrow + \text{Na}_2\text{SO}_4$

Описаны признаки протекания реакций:

- 3) для первой реакции: выделение бесцветного газа;
- 4) для второй реакции: образование белого аморфного осадка.

Составлено сокращённое ионное уравнение второй реакции:



Оценивание: Ответ правильный и полный, содержит все названные элементы, 4 балла.

Пример № 3.

Даны вещества: Mg, HCl (разб.), Fe, Al, KOH, CuSO_4 . Используя воду и необходимые вещества только из этого списка, получите в две стадии гидроксид магния(II). Опишите признаки проводимых реакций. Для реакции ионного обмена напишите сокращённое ионное уравнение реакции.

Элементы ответа:

Составлены два уравнения реакции:

- 1) $Mg + 2HCl = MgCl_2 + H_2 \uparrow$
- 2) $MgCl_2 + 2KOH = Mg(OH)_2 \downarrow + 2KCl$

Описаны признаки протекания реакций:

- 3) для первой реакции: выделение бесцветного газа;
- 4) для второй реакции: образование белого аморфного осадка.

Составлено сокращённое ионное уравнение второй реакции:



Оценивание: Ответ правильный и полный, содержит все названные элементы, 4 балла.

Пример № 4.

Даны вещества: Zn, HCl(разб.), NaCl, K₃PO₄, NaOH, CuO. Используя воду и необходимые вещества только из этого списка, получите в две стадии медь. Опишите признаки проводимых реакций. Для реакции замещения напишите сокращённое ионное уравнение.

Элементы ответа:

Составлены два уравнения реакции:


- 1) $CuO + 2HCl = CuCl_2 + H_2O$
- 2) $CuCl_2 + Zn = ZnCl_2 + Cu$

Описаны признаки протекания реакций:

- 3) для первой реакции: растворение осадка и появление синевато-зелёной окраски раствора;

- 4) для второй реакции: цементация на цинке красного осадка меди.

Составлено сокращённое ионное уравнение второй реакции:



Оценивание: Ответ правильный и полный, содержит все названные элементы, 4 балла

Для закрепления материала выполните следующие задания.

Самостоятельная работа.

Используя только реагенты из приведённого перечня, запишите молекулярные уравнения двух реакций, которые характеризуют химические свойства веществ и укажите признаки их протекания (наличие/отсутствие запаха у газа, цвет осадка или раствора). Для реакции замещения (обмена) запишите сокращённое ионное уравнение.

А) Даны вещества: CaCO₃, CuO, растворы HNO₃, K₂SO₄, NaOH, H₂O₂. Используя воду и необходимые вещества только из этого списка, получите в две стадии гидроксид меди(II). Опишите признаки проводимых реакций. Для реакции ионного обмена напишите сокращённое ионное уравнение.

Б) Даны вещества: Fe, CuO, растворы H₂O₂, CuSO₄, H₂SO₄, NaOH. Используя воду и необходимые вещества только из этого списка, получите в две стадии гидроксид меди(II). Опишите признаки проводимых реакций. Для первой реакции напишите сокращённое ионное уравнение.

В) Даны реагенты: алюминий, карбонат натрия и растворы соляной кислоты, хлорида алюминия и гидроксида натрия. Требуется получить гидроксид алюминия в результате проведения двух последовательных

реакций. Составьте схему превращений, в результате которых можно получить указанное вещество. Запишите уравнения двух реакций. Опишите признаки проводимых реакций. Для первой реакции составьте сокращённое ионное уравнение.

Г) Даны реагенты: магний, медь, карбонат натрия и растворы соляной кислоты, гидроксида натрия и фосфорной кислоты. Требуется получить гидроксид магния в результате проведения двух последовательных реакций. Составьте схему превращений, в результате которых можно получить указанное вещество. Запишите уравнения двух реакций. Опишите признаки проводимых реакций. Для реакции ионного обмена составьте сокращённое ионное уравнение.


Ответы к самостоятельным работам

Задание 20.



1| $\text{N}^{+5} + 3 \text{e}^- \rightarrow \text{N}^{+2}$ (процесс восстановления; N^{+5} - окислитель)

3| $\text{Ag}^0 - 1 \text{e}^- \rightarrow \text{Ag}^{+1}$ (процесс окисления; Ag^0 - восстановитель)




3| $\text{P}^0 - 5 \text{e}^- \rightarrow \text{P}^{+5}$ (процесс окисления; P^0 - восстановитель)

5| $\text{N}^{+5} + 3 \text{e}^- \rightarrow 5 \text{N}^{+2}$ (процесс восстановления; N^{+5} - окислитель)




1| $\text{S}^{-2} - 8 \text{e}^- \rightarrow \text{S}^{+6}$ (процесс окисления; S^{-2} - восстановитель)

4| $\text{Cl}_2^0 + 2 \text{e}^- \rightarrow 2\text{Cl}^{-1}$ (процесс восстановления; Cl_2^0 - окислитель)



2| $\text{Cu}^{+1} - 1 \text{e}^- \rightarrow \text{Cu}^{+2}$ (процесс окисления; Cu^{+1} - восстановитель)




1| $\text{S}^{+6} + 2 \text{e}^- \rightarrow \text{S}^{+4}$ (процесс восстановления; S^{+6} - окислитель)





1| $\text{S}^{+6} + 8 \text{e}^- \rightarrow \text{S}^{-2}$ (процесс восстановления; S^{+6} - окислитель)

4| $2\text{I}^{-1} - 2 \text{e}^- \rightarrow \text{I}_2^0$ (процесс окисления; I^{-1} - восстановитель)

Задание 21.





Задание 22.

- A) Ответ: 9%.
 Б) Ответ: 75%.
 В) Ответ: 22,7 л.
 Г) Ответ: 6,8 г.

Задание 23.

- A) 1) $\text{CuO} + 2\text{HNO}_3 = \text{Cu}(\text{NO}_3)_2 + \text{H}_2\text{O}$
 2) оксид меди(II) — вещество чёрного цвета, растворяется в азотной кислоте и образуется раствор голубого цвета.
 3) $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2 + 2\text{NaOH} = \text{Cu(OH)}_2 \downarrow + 2\text{NaNO}_3$
 4) $\text{Cu}^{2+} + 2\text{OH}^- = \text{Cu(OH)}_2 \downarrow$
 5) образуется осадок голубого цвета
- Б) 1) $\text{CuO} + \text{H}_2\text{SO}_4 = \text{CuSO}_4 + \text{H}_2\text{O}$
 2) $\text{CuO} + 2\text{H}^+ = \text{Cu}^{2+} + \text{H}_2\text{O}$
 3) оксид меди(II) — вещество чёрного цвета, растворяется и образуется раствор синего цвета
 4) $\text{CuSO}_4 + 2\text{NaOH} = \text{Cu(OH)}_2 \downarrow + \text{Na}_2\text{SO}_4$
 5) образуется осадок Cu(OH)_2 синего цвета.
- В) 1) $2\text{Al} + 6\text{HCl} = 2\text{AlCl}_3 + 3\text{H}_2 \uparrow$
 2) $2\text{Al}^0 + 6\text{H}^- = 2\text{Al}^{3+} + 3\text{H}_2^0$
 3) выделение бесцветного газа $\text{H}_2 \uparrow$
 4) $\text{AlCl}_3 + 3\text{NaOH} = \text{Al}(\text{OH})_3 \downarrow + 3\text{NaCl}$
 5) выпадение осадка белого цвета
- Г) 1) $\text{Mg} + 2\text{HCl} = \text{MgCl}_2 + \text{H}_2 \uparrow$
 2) выделение бесцветного газа $\text{H}_2 \uparrow$
 3) $\text{MgCl}_2 + 2\text{NaOH} = \text{Mg}(\text{OH})_2 \downarrow + 2\text{NaCl}$
 4) $\text{Mg}^{2+} + 2\text{OH}^- = \text{Mg}(\text{OH})_2 \downarrow$
 5) выпадение осадка белого цвета. [13]

Список литературы

1. И.И. Новошинский, Н.С. Новошинская учебник для общеобразовательных организаций. 9 класс. Москва. «Русское слово» 2013 г.
2. Г.Е. Рудзитис Ф.Г. Фельдман учебник для общеобразовательных организаций. 8 класс. Москва. «Просвещение» 2017 г.
3. Г.Е. Рудзитис Ф.Г. Фельдман учебник для общеобразовательных организаций. 9 класс. Москва. «Просвещение» 2018 г.
4. <https://nsportal.ru/shkola/khimiya/library/2014/03/02/sostavlenie-uravneniy-ovr-metodom-elektronnogo-balansa>
5. https://prosto-o-slognom.ru/chimia_ovr/08_metod_elektronnogo_balansa.html
6. <https://profmeter.com.ua/communication/learning/course/course6/lesson326/>
7. <https://himi4ka.ru/arhiv-urokov/urok-42-vzaimosvjaz-mezhdu-klassami-neorganicheskikh-veshhestv.html>
8. <https://chemege.ru/reakcii-ionnogo-obmena/>
9. <https://natalibrilenova.ru/protekanie-himicheskikh-reaktsij/>
10. <https://gomolog.ru/reshebniki/9-klass/gabrielyan-2018/41/ispol-2.html>
11. <https://chemege.ru/real-var-oge-po-ximii-2021-6/>
12. <https://infourok.ru/shemi-prevrashcheniy-po-neorganicheskoy-himii-271085.html>
13. https://neznaika.info/oge/chem_oge/
14. <https://nsportal.ru/shkola/khimiya/library/2012/01/15/kachestvennye-reaktsii-na-ionsy-tablitsy>
15. <https://skysmart.ru/articles/chemistry/oksidy>
16. <https://nsportal.ru/shkola/khimiya/library/2017/11/28/urok-v-8-klasse-stepen-okisleniya>
17. <https://paramitacenter.ru/node/525>